

Kyste palpébral révélant une filariose : à propos d'un cas et revue de la littérature

Ben Arif Y, Boudawara.F, Hablani.H, Ochi.N, Dhouib.M, Abdelmoula.M

Service de chirurgie maxillo-faciale et esthétique, Hôpital Habib Bourguiba Sfax, Tunisie

Introduction

Les localisations palpébrales de la filariose sont rares, même en zone d'endémie. Leur présentation pseudotumorale peut simuler des pathologies bénignes plus courantes, retardant le diagnostic.

Présentation clinique

Nous rapportons le cas d'un patient présentant une tuméfaction kystique, indolore du canthus interne. L'échographie a montré une structure enroulée aux parois échogènes parallèles. L'exérèse chirurgicale a été réalisée, et l'analyse anatomo-pathologique a révélé la présence de structures vermiformes éosinophiles caractéristiques, confirmées comme des microfilaires, posant ainsi le diagnostic de kyste filarien.

Discussion

La localisation palpébrale de la filariose constitue une forme rare de cette parasitose. Elle se manifeste le plus souvent par un nodule ou un kyste sous-cutané, indolore et d'évolution lente au niveau de la paupière. Cette présentation clinique, peu spécifique, mime fréquemment des pathologies bénignes courantes telles qu'un kyste dermoïde ou une tumeur annexielle, ce qui peut retarder le diagnostic. La confirmation est avant tout histologique, après exérèse chirurgicale de la lésion, révélant la présence caractéristique de microfilaires au sein d'une réaction inflammatoire granulomateuse.

La prise en charge associe l'exérèse chirurgicale complète à un traitement antiparasitaire systémique pour éliminer les microfilaires circulantes et prévenir les complications lymphatiques à distance. Cette entité illustre l'importance d'inclure les parasitoses dans le diagnostic différentiel des masses palpébrales, même en contexte non endémique.



Aspect échographique



Aspect du kyste en per opératoire

Conclusion

Une lésion kystique apparemment banale du canthus interne peut révéler une filariose. Un examen histopathologique systématique est essentiel pour éviter les erreurs diagnostiques et permettre une prise en charge adaptée, incluant un traitement antiparasitaire.